

INFORMACIÓ GENERAL: L'exploració mitjançant RM és una tècnica que obté imatges anatòmiques del cos humà, utilitzant un imant d'alt camp i ones de radiofreqüència. La RM no utilitza radiacions ionitzants (RX) ni es coneixen efectes adversos en l'organisme. L'ús de camps magnètics alts requereix deixar fora de la sala d'exploració tots els elements metàl·lics i/o electrònics que pugui portar, tals com rellotge, joies, telèfon, targetes de crèdit, etc.

EDAT: _____ **PES:** _____ **ALÇADA:** _____

--

	Si	No
S'ha fet anteriorment alguna Ressonància Magnètica?		
En cas afirmatiu, indiqui quina part del cos:		
Li han fet alguna intervenció quirúrgica?		
En cas afirmatiu, indiqui el tipus d'intervenció:		
ÉS PREFERIBLE NO REALITZAR RM A DONES EMBARASSADES. SI ESTÀ EMBARASSADA O POT ESTAR-HO, S'HA DE COMUNICAR AL PERSONAL SANITARI ABANS DE SOTMETRE'S A LA PROVA		

! CONTRAINDICACIONS DE LA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA

ABSOLUTES	Si	No	POSSIBLES	Si	No
Marcapassos / Dai			Endopròtesis, Clips Vasculars, Catèters		
Electroestimuladors			Audiòfons, Pròtesi d'oïda		
Desfibril·ladors			Filtres Vasculars, Stents, Vàlvula cardíaca		
Bomba d'Insulina			Objectes Metàl·lics als ulls		
Expansor Mamari			Bomba d'infusió, Neuroestimuladors		
Pròtesis Endococlears			Pròtesis Articulars, Fragments Metàl·lics		
DATA D'INSERCIÓ DE L'OBJECTE:					

REALITZACIÓ DE LA PROVA

És una prova que pot ser llarga (entre 20 i 60 minuts). En tot moment estarà controlat pel tècnic, a més disposarà d'un dispositiu d'alarma, donat el cas que es trobi malament i no pugui continuar l'exploració.

És molt important romandre ben quiet mentre es realitza l'exploració.

ESTÀ D'ACORD I DONA CONSENTIMENT PER REALIZAR LA PROVA Si No

CONTRAST ENDOVENOS

Algunes exploracions RM requereixen l'administració endovenosa de contrast paramagnètic.

Gadolini: És un mitjà de contrast per Ressonància Magnètica. Pot ajudar al metge a visualitzar estructures o lesions, facilitant així el diagnòstic.

Els **efectes secundaris** més freqüents (pot afectar a 5 per cada 1000 pacients) són la cefalea, nàusees i marejos. En casos més greus (menys comuns) poden presentar-se reaccions similars a la al·lèrgia que poden necessitar d'una immediata assistència mèdica. Excepcionalment efectes secundaris més greus que han sigut mortals o potencialment mortals, en alguns casos.

Extravasació del contrast: La vena pot trencar-se durant la injecció i pot provocar una acumulació de contrast en el teixit tou. No és perillós i generalment amb tractament mèdic, te solució en dos o tres dies.

! Contraindicacions per l'administració del contrast

	Si	No		Si	No
Insuficiència Renal			Al·lèrgia al contrast		
Transplantament hepàtic			Lactància		

ESTÀ D'ACORD I DONA CONSENTIMENT PER ADMINISTRAR CONTRAST Si No

PACIENT, FAMILIAR O REPRESENTANT: _____ **SIGNATURA:** _____

NOM I COGNOMS: _____ **DNI:** _____

METGE RESPONSABLE: _____ **SIGNATURA:** _____

Nº COLEGIAT: _____