

INFORMACIÓN GENERAL: La exploración mediante RM es una técnica que se obtiene imágenes anatómicas del cuerpo humano, utilizando un imán de alto campo y ondas de radiofrecuencia. La RM no utiliza radiaciones ionizantes (RX) ni se conocen efectos secundarios para el organismo. El uso de campos magnéticos altos, requieren dejar fuera de la sala todos los elementos metálicos y electrónicos que pueda llevar, tales como relojes, joyas, teléfono, tarjetas de crédito, etc

EDAD: _____ **PESO:** _____ **ALTURA:** _____

	Si	No
¿Se ha realizado anteriormente alguna resonancia magnética?		
En caso afirmativo, indique que parte del cuerpo:		
¿Le han realizado alguna intervención quirúrgica?		
En caso afirmativo, indique tipo de intervención:		
ES PREFERIBLE NO REALIZAR RM A MUJERES EMBARAZADAS, SI ESTÁ EMBARAZADA O CREE QUE PUEDE ESTARLO, DEBE COMUNICARLO A NUESTRO PERSONAL ANTES DE SOMETERSE A LA PRUEBA		

! CONTRAINDICACIONES DE LA RESONANCIA MAGNÉTICA

ABSOLUTAS	Si	No	POSIBLES	Si	No
Marcapasos			Endoprótesis, Clips Vasculares, Catéteres		
Electroestimuladores			Audiófonos, Prótesis de oído		
Desfibriladores			Filtros Vasculares, Stents, Válvula cardíaca		
Bomba de Insulina			Objetos Metálicos en los ojos		
Expansor Mamario			Bomba de infusión, Neuroestimuladores		
Prótesis Endococleares			Prótesis Articulares, Fragmentos Metálicos		
DATA DE INSERCIÓN DEL OBJETO:					

REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

Es una prueba que puede ser larga (entre 20 y 60 minutos). Siempre estará controlado por el técnico, además dispondrá de un dispositivo de alarma, dado el caso que se encuentre mal o no pueda continuar con la exploración.

Es muy importante permanecer quieto mientras le realizan la exploración.

ESTÁ DE ACUERDO Y DA EL CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA Si ☐ No ☐

CONTRASTE ENDOVENOSO

Algunas exploraciones RM requieren la administración endovenosa de contraste paramagnético.

Gadolinio: Es un medio de contraste para resonancia magnética (RM). Puede ayudar al médico, a visualizar estructuras o lesiones, facilitando así el diagnóstico.

Los **efectos secundarios** más frecuentes (puede afectar a 5 por cada 1000 pacientes) son la cefalea, náuseas y mareos. En caso más graves (menos comunes) pueden presentar reacciones similares a la alergia, que pueden necesitar de inmediata asistencia médica. Excepcionalmente efectos secundarios más graves que han sido mortales o potencialmente mortales en algunos casos.

Extravasación de contraste: La vena se puede romper durante la inyección y puede provocar una acumulación de contraste en tejidos blandos. No es peligroso y generalmente con tratamiento médico, tiene solución en dos o tres días.

! Contraindicaciones para la administración de contraste

	Si	No		Si	No
Insuficiencia Renal			Alergias al contraste		
Trasplante hepático			Lactancia		

ESTÁ DE ACUERDO Y DA EL CONSENTIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CONTRASTE Si ☐ No ☐

PACIENTE, FAMILIAR O REPRESENTANTE: _____ **FIRMA:** _____

NOMBRE Y APELLIDOS: _____ **DNI:** _____

MÉDICO RESPONSABLE: _____ **FIRMA:** _____

Nº COLEGIADO: _____